

Tình quan và bệnh nang Tarlov cấp tính

Vị trí biên tập viên

Thứ hai, 30 Tháng 9 2024 14:20 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 30 Tháng 9 2024 14:28

4. Triệu chứng của bệnh

Triệu chứng của nang Tarlov rất đa dạng và phụ thuộc vào kích thước cũng như vị trí của nang. Các triệu chứng phổ biến bao gồm:

- Đau lưng dữ dội
- Cảm giác căng thẳng hoặc nóng rát ở phía dưới lan đến chân
- Tê hoặc yếu ở chân
- Nhìn mờ hoặc nhìn đôi do chèn ép dây thần kinh thị giác hoặc tảo mắt
- Nhức đầu...

5. Chẩn đoán bệnh

Chẩn đoán nang Tarlov thường gặp khó khăn do triệu chứng tương tự với nhiều bệnh khác như thoát vị đĩa đệm hay viêm màng nhện. Phương pháp xác định chính xác bao gồm chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp CT xác định hình thái và kích thước của các nang.

6. Điều trị bệnh

Điều trị nang Tarlov có thể chia thành hai loại: không phẫu thuật và phẫu thuật

Điều trị không phẫu thuật: Bao gồm sử dụng thuốc giảm đau, tiêm steroid để giảm viêm, hoặc dùng thuốc chống co cứng cơ.

- Chèn hút dịch não tủy từ nang dưới hướng dẫn CT là một biện pháp để giảm áp lực và cải thiện triệu chứng, nhưng nhược điểm là không ngăn chặn được tái phát của nang.
- Kỹ thuật tiêm keo fibrin vào nang sau khi chèn hút cũng đã được áp dụng, nhằm ngăn ngừa dịch não tủy quay trở lại trong nang. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này cũng có thể khác nhau giữa các bệnh nhân, và một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tái phát triệu chứng vẫn có thể xảy ra.

Tình quan và bệnh nang Tarlov cột sống

Vị trí biên tập viên

Thứ hai, 30 Tháng 9 2024 14:20 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 30 Tháng 9 2024 14:28

Điều trị bệnh phồng u thuỷ tủy:

- Phồng u thuỷ tủy cột sống là phương pháp phẫu thuật để điều trị nang Tarlov. Trong quá trình này, bác sĩ bóc bỏ vùng cột sống cổ nang, tháo bỏ đĩa đệm và bóc bỏ các chèn ép khác vào đĩa đệm ngăn ngừa tái phát.
- Các phương pháp phẫu thuật khác có thể bao gồm cắt bỏ rễ thần kinh hoặc bóc tách vi phồng u nang. Mặc dù phẫu thuật thường giảm triệu chứng, nhưng cũng có rủi ro, như nhiễm trùng hoặc rò rỉ đĩa đệm não tủy.

Mọi phương pháp điều trị cần được cân nhắc dựa trên triệu chứng cụ thể và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

7. Tiên lượng và chất lượng cuộc sống

Mặc dù triệu chứng ở bệnh nang Tarlov không góp phần vào triệu chứng nguy hiểm, nhưng nếu có triệu chứng thì việc điều trị phù hợp rất quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống. Hơn 80% bệnh nhân đã trải qua trải nghiệm cột sống nang ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong tình trạng sức khỏe của họ.

Tham khảo từ: Mayo clinic, National Institute of Health, American Association of Neurological Surgeon