

Viêm đ̣i tr̄ng do b̄ch c̄u ái toan

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 24 Tháng 12 2024 16:18 -

Bs. Trần Thị Minh Thành -

ĐI CÙNG

Bệnh lý đường tiêu hóa tăng bạch cầu ái toan là một tình trạng hiếm gặp đặc trưng bởi sự xâm nhập bất thường của bạch cầu ái toan vào niêm mạc đường tiêu hóa. Nó có thể được chia thành viêm thực quản, viêm dạ dày ruột và viêm đ̣i tr̄ng. Viêm đ̣i tr̄ng tăng bạch cầu ái toan (EoC) có thể là nguyên phát, không có nguyên nhân rõ ràng và thâm nhiễm bạch cầu ái toan hoặc thứ phát do một nguyên nhân đã xác định.

Viêm đ̣i tr̄ng do bạch cầu ái toan là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trẻ sinh và trẻ em dưới 2 tuổi, nhưng hiếm gặp hơn (một vài trường hợp cá biệt) và ít được nghiên cứu ở người lớn. Trong một nghiên cứu dịch tễ học hồi cứu quy mô lớn được thực hiện ở Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc viêm bạch cầu ái toan là 3,7/100.000 và tỷ lệ mắc viêm bạch cầu ái toan nguyên phát là 2,4/100.000 dân. Con số viêm bạch cầu ái toan gần như chắc chắn đánh giá thấp vì nó chưa được hiểu rõ, mặc dù tần suất xuất hiện của nó có thể tăng lên trong những năm gần đây.

Việc chẩn đoán viêm bạch cầu ái toan hiện dựa trên 2 vấn đề liên quan đến số thiểu đường thu được và mức độ sinh lý của viêm bạch cầu ái toan ở niêm mạc đ̣i tr̄ng bình thường và tiêu chuẩn chẩn đoán mô học của bệnh.

Mặc dù nguyên nhân và sinh lý bệnh của bệnh vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng vai trò của các chất gây dị ứng là không thể phủ nhận, vì dị ứng có thể gặp ở hơn 3/4 số trường hợp viêm đ̣i tr̄ng do bạch cầu ái toan.

