


Bs Phạm Tuấn Trà -

Tổng quan

Ung thư trực tràng phổ biến nhất trên toàn thế giới và tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng, đặc biệt là ở nhóm dân số trẻ. Ung thư trực tràng khác biệt đáng kể so với ung thư đại tràng về mặt sinh học, lâm sàng, đi u tr và theo dõi. Xét nghiệm đã là tiêu chuẩn đi u tr quan trọng của phương pháp tiếp cận đa phương thức trong ung thư trực tràng tiến triển tái phát và khi kết hợp với hóa trị và phẫu thuật, tỷ lệ kiểm soát tái phát cao đáng kể. Di căn xa vẫn là nguyên nhân chính gây tử vong đi u tr và tỷ vong của bệnh nhân.

Liệu pháp tân bào trị, th ức hi ến tr ợ c phẫu thuật triệt căn, h ợ c đ ến hai m ợ c tiêu chí: (1) giảm giai đoạn khu i u, đ ể t ạo đi u ki ến cho phẫu thuật triệt căn và ngăn ngừa tái phát tái phát ; và (2) loại bỏ các vi di căn xa, đ ể tránh tái phát toàn thân. Trong tr ợ c h ợ c ung thư trực tràng, m ợ c tiêu khác có thể là (3) bỏ o t ến c ả th ể t h ợ c phẫu thuật tiếp cận không phẫu thuật. Liệu pháp tân bào trị cũng có thể làm tăng số tuần th ể phác đ ể đi u tr do khả năng dung nạp tốt hơn và có khả năng rút ngắn thời gian đi u tr .

Liệu pháp tân bào trị toàn phần (Total neoadjuvant therapy: TNT) bao gồm và áp dụng tất cả các phương thức đi u tr ch ợ c ung thư tr ợ c khi phẫu thuật triệt căn. Khái niệm này không m ợ i nh ợ c tr ợ c khi tr ợ c thành m ợ t ph ợ n tiêu chuẩn của việc quản lý ung thư trực tràng, c ợ n đánh giá c ợ n th ợ n các ợ u và nh ợ c đ ể m và xác đ ể nh các th ể t ợ p t ợ i ợ u.



C p nh t đi  u tr  t n b  tr  ung th  tr  c tr ng

Vi t b i Bi n t p vi n

Th  sáu, 10 Th ng 1 2025 10:54 - L n c p nh t cu i Th  sáu, 10 Th ng 1 2025 11:04

[Xem ti p t i đ y](#)