

## BSCCKII. Lê Thị Đĩnh -

### GIỚI THIỆU

Ít nhất 1% dân số sử dụng liều pháp glucocorticoid mạn tính như thuốc chống viêm và ức chế miễn dịch. Hầu như mọi chuyên ngành y học đều áp dụng glucocorticoid qua nhiều đường dùng (uống, hít, nhúng mũi, trong khớp, tiêm chằng và tiêm tĩnh mạch), và thường xuyên trong thời gian dài. Sự ức chế của trục hạ đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận (HPA) là tác động trực tiếp của liều pháp glucocorticoid ngoại sinh mạn tính và sự phức tạp của chức năng tuyến thượng thận rất khác nhau giữa các cá nhân. Suy thận mạn liên quan glucocorticoid cần được giáo dục và quản lý cẩn thận, và trong những trường hợp cần suy thận mạn cấp, việc chẩn đoán và điều trị phải kịp thời. Xét thấy việc sử dụng liều glucocorticoid và nguy cơ mắc bệnh suy thận mạn do glucocorticoid gây ra, hàng ngày nên thực hành lâm sàng hiện hành đã công bố hàng ngày và tình trạng liên quan đến lâm sàng này để hỗ trợ các chuyên gia nội tiết, cũng như bác sĩ đa khoa và các chuyên gia khác có liên quan đến việc chăm sóc những người bệnh này.


### ĐẶC THÙ HẠC VỚI LIỀU PHÁP GLUCOCORTICOID

Kể từ khi được tiên đoán mô tả vào cuối thập niên 1940, glucocorticoid vẫn là tác nhân phổ biến trong điều trị nhiều tình trạng bệnh lý, từ các bệnh tự miễn, rối loạn viêm và phản ứng dị ứng nghiêm trọng đến việc ngăn ngừa sẹo sẹo và là tác nhân chống ung thư cho các khối u tân sinh và huyết khối. Các nghiên cứu trước đó cho thấy rằng liều sử dụng glucocorticoid thường uống là khoảng 1% dân số người trưởng thành ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Dựa trên dân số hơn 65.000 bệnh nhân đã đăng ký với bác sĩ đa khoa vào năm 1995 tại Vương quốc Anh, glucocorticoid được uống liên tục (> 3 tháng) được kê đơn cho 0,5% tổng dân số và 1,4% bệnh nhân từ 55 tuổi trở lên. Dựa liệu từ Vương quốc Anh cho thấy được thuốc glucocorticoid dài hạn tăng từ 0,59% lên 0,79% ở bệnh nhân tuổi trưởng thành trong giai đoạn 1989-2008. Trong một nghiên cứu dựa trên dân số tại Đan Mạch, tổng kê được glucocorticoid toàn thân hàng năm trong chăm sóc ban đầu được phát hiện là 3% với tỷ lệ cao đáng kể ở người cao tuổi lên tới 10% trong giai đoạn 1999 - 2015.

## Chẩn đoán và điều trị suy thận liên quan Glucocorticoids

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 08 Tháng 3 2025 10:36 -



[Xem tiếp tại đây](#)