

Áp xe gan

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 18 Tháng 6 2025 21:43 -

BS Nguyễn Hông Ga - Khoa CĐHA

Tổng quan

Áp xe gan, giống như áp xe ở những nơi khác, là tập trung khu trú của mô viêm hoại tử do các tác nhân là vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc nấm. Thông thường, quá trình hình thành áp xe gan bắt đầu khi có sự rò rỉ tế bào bạch cầu trong khoang bụng, sau đó các tác nhân gây nhiễm trùng (như vi khuẩn) sẽ di chuyển đến gan thông qua tĩnh mạch cửa. Ngoài ra, nhiễm trùng huyết áp xe gan cũng xuất phát từ tình trạng nhiễm trùng đường mật (viêm đường mật) gây ra áp xe thông qua sự tiếp xúc trực tiếp.

Áp xe gan có thể được phân loại theo nhiều cách. Có thể theo vị trí trong gan: hơn 50% trường hợp huyết áp xe ở thùy gan phải vì nó chiếm phần lớn của gan và có hệ thống mạch máu phong phú hơn (đặc biệt là tĩnh mạch cửa); thùy gan trái và thùy đuôi thì ít hơn. Hoặc có thể phân loại theo nguyên nhân: phần lớn nhất là áp xe gan do vi khuẩn, trong đó trường hợp gặp nhất là E.Coli, Klebsiella sp, Streptococcus, Staphylococcus, ngoài ra còn áp xe do ký sinh trùng (chủ yếu là Amip), nấm.

Áp xe gan

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 18 Tháng 6 2025 21:43 -



[Xem tiếp tại đây](#)