

## Bs Huỳnh Công -

Nhiễm trùng sản phụ khoa là một thách thức lớn trong y học hiện đại, không chỉ gây ra biến chứng và tử vong đáng kể cho phụ nữ mà còn đặt ra gánh nặng lớn cho hệ thống y tế. Trong bối cảnh tình hình kháng kháng sinh ngày càng trầm trọng, việc hiểu rõ về nguyên nhân, tác nhân gây bệnh, đặc biệt là các chủng vi khuẩn kháng thuốc, cùng với các chiến lược điều trị và dự phòng hiệu quả trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo báo cáo của WHO, 7% phụ nữ mắc nhiễm trùng hậu sản, trong đó tỷ lệ tại châu Á là 11%.

### I. Nguyên nhân

Nhiễm trùng sản phụ khoa bao gồm các tình trạng viêm nhiễm ở đường sinh dục dưới (âm đạo, cổ tử cung) và đường sinh dục trên (tử cung, vòi trứng, buồng trứng), cũng như các nhiễm trùng liên quan đến quá trình thai sản và phẫu thuật.

Nguyên nhân gây bệnh thường xuất phát từ:

- Vi khuẩn tự nhiên vi sinh vật bình thường: Nhiễm vi khuẩn thường trú ở âm đạo, đường ruột (như *Streptococcus agalactiae* – GBS, *Escherichia coli*, *Bacteroides* spp., *Enterococcus faecalis*) có thể trở thành tác nhân gây bệnh khi có điều kiện thuận lợi.
- Vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục (STIs): Các tác nhân như *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Mycoplasma genitalium* có thể gây ra các nhiễm trùng ở đường sinh dục trên.
- Vi khuẩn từ môi trường bệnh viện: Đặc biệt trong nhiễm trùng vết mổ hoặc nhiễm trùng hậu sản, các chủng vi khuẩn bệnh viện như *Staphylococcus aureus* (bao gồm MRSA) hoặc *Pseudomonas aeruginosa* là những mối lo ngại.



## Kháng sinh trong nhiễm trùng sọ não phổ biến khoa và vấn đề kháng thuốc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 15 Tháng 7 2025 08:42 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 15 Tháng 7 2025 08:55

---

[Xem tiếp tại đây](#)