

Bs Trần Lê Pháp -

ĐI CÙNG

Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa (NKĐTN) bao gồm một loạt các tình trạng lâm sàng và bệnh lý khác nhau dựa trên vị trí khác nhau của nhiễm trùng. Mỗi tình trạng có đặc điểm khác, diễn tiến tự nhiên và tiêu chí chẩn đoán riêng. Việc phân biệt chính xác là rất quan trọng vì bệnh đường tiêu hóa đáng kể dẫn đến tử vong và tiên lượng. Do đó, việc chẩn đoán hóa sinh học là cần thiết để báo động giao tiếp hiệu quả về chẩn đoán này. Hội thảo về nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phân loại NKĐTN. Hội thảo được tổ chức bởi Hội đồng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA), Hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm châu Âu (ESCMID) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Các hướng dẫn hiện tại về chẩn đoán phân biệt giữa NKĐTN không bị nhiễm khuẩn và có bị nhiễm khuẩn, với một số điều chỉnh. Theo các định nghĩa này, NKĐTN không bị nhiễm khuẩn xảy ra ở phần lớn bệnh nhân, không mang thai, còn tất cả các trường hợp còn lại được xếp vào NKĐTN có bị nhiễm khuẩn. Cách phân loại này được giới thiệu, nhưng tiêu chuẩn rõ ràng vì có thể bệnh đường tiêu hóa đáng kể dẫn đến tử vong và tiên lượng tử vong.

Hội đồng xây dựng Hướng dẫn để xuất bản số phân loại mới cho NKĐTN nhằm tăng tính thống nhất trong thực hành lâm sàng và cung cấp một khung toàn diện để hiểu các biểu hiện lâm sàng khác nhau. Phân loại được đề xuất không còn sử dụng thuật ngữ “không bị nhiễm khuẩn” và “có bị nhiễm khuẩn”; thay vào đó, nhận diện sự khác biệt giữa NKĐTN khu trú và NKĐTN toàn thân, được xác định dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng.

Nhiễm trùng đường tiết niệu khu trú (ví dụ: viêm bàng quang)

- Viêm bàng quang với các dấu hiệu/triệu chứng điển hình (ví dụ: tần suất, cấp bách, đau trên xương mu)
- Không có dấu hiệu/triệu chứng nhiễm trùng toàn thân
- Áp dụng cho tất cả các giới tính
- Các yếu tố rủi ro có thể hiện diện và cần được giải quyết



[Xem ti p t i đây](#)

UTI toàn thân

- Nhiễm trùng đường tiết niệu có dấu hiệu/triệu chứng nhiễm trùng toàn thân (ví dụ: sốt, ớn lạnh)
- Cũng có thể bao gồm các triệu chứng điển hình tại chỗ (ví dụ như viêm bể thận hoặc viêm tuyến tiền liệt)
- Các yếu tố rủi ro có thể hiện diện và cần được giải quyết

