

Gây mê hô hấp trên bệnh nhân tăng huyết áp

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 02 Tháng 12 2025 20:07 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 02 Tháng 12 2025 20:14

Bs Đỗ Ngọc Văn Truyên

ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hiện đã có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới mắc bệnh tăng huyết áp và mỗi năm có khoảng 9,4 triệu người bị tăng huyết áp đã tử vong.

Tại Việt Nam, có khoảng 12 triệu người mắc tăng huyết áp, có 5 người tử vong hàng năm có 1 người tăng huyết áp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng diễn biến bệnh nhân chưa được phát hiện bệnh hoặc đã phát hiện nhưng chưa kiểm soát được bệnh.

Theo Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia được tiến hành từ năm 1998, tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp ở Hàn Quốc không thay đổi nhiều trong 20 năm qua (29,8% vào năm 1998 và 29,1% vào năm 2006), nhưng tổng số bệnh nhân đã tăng từ 7,6 triệu vào năm 1998 lên 11,7 triệu vào năm 2016 do thay đổi lối sống và gia tăng dân số cao tuổi [1]. Do đó, các bác sĩ lâm sàng có nhiệm vụ khám sàng lọc bệnh nhân theo dõi bệnh nhân tăng huyết áp trong quá trình gây mê và trước và sau phẫu thuật.

$HA = LLT \times SCMMNB$. Vì vậy, tăng HA do tăng LLT hoặc/và tăng SCMMNB. Tăng HA không chỉ gây ra những biến loạn hệ thống tuần hoàn mà còn dẫn đến những tổn thương ở các cơ quan đích (tim, não, mắt, thận...). Phát hiện và đánh giá diễn biến trước các yếu tố nguy cơ bệnh cách điểu trị bệnh nhân bệnh tăng HA trước phẫu thuật có chu trình bệnh tìm kiếm pháp xử trí và đề phòng các biến chứng do tăng HA xảy ra khi phẫu thuật và sau phẫu thuật cấp cứu.

Gây mê hời sọc trên bệnh nhân tăng huyết áp

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 02 Tháng 12 2025 20:07 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 02 Tháng 12 2025 20:14



[Xem tiếp tại đây](#)