

BS Phan Tuấn Kiệt – Khoa CĐHA

Tổng quan

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Ung thư cổ tử cung cùng với ung thư nội mạc tử cung chiếm 0,7% tổng số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu.


Phương pháp điều trị chính cho ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến triển (giai đoạn \geq IB) là hóa xạ trị (CRT), sau đó là xạ trị áp sát (brachytherapy). Phần lớn các trường hợp, khi đã đáp ứng hoàn toàn và không cần thiết phải phẫu thuật thêm. Trong số ít các trường hợp có khi còn tiến triển sau khi hoàn thành CRT, cần phải cắt bỏ phẫu thuật bổ sung. Ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm được điều trị bằng phẫu thuật bóc tử cung.

Các yếu tố nguy cơ chính trong ung thư cổ tử cung cần được đánh giá qua hình ảnh là kích thước khối u, xâm lấn vào chung cung, thành chậu, âm đạo, bàng quang hoặc trực tràng, và hạch.

Đánh giá giai đoạn ung thư cổ tử cung trên MRI

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 14 Tháng 1 2026 16:28 -



[Xem tiếp tại đây](#)