

## Phong bì đám rối i thẹn kinh cánh tay để ngách so với các kỹ thuật gây tê vùng khác


Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 02 Tháng 2 2026 10:06 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 02 Tháng 2 2026 10:31

### Bs.Thuật Ngọc Chàng -

Chỉ định thực hiện gói phẫu thuật của phong bì đám rối i thẹn kinh cánh tay để ngách (axillary brachial plexus block – ABPB) bao gồm phẫu thuật cánh tay, cẳng tay hoặc bàn tay có thời gian chờ đợi dài, có hoặc không dùng garo cánh tay. Kỹ thuật này gây tê đám rối i thẹn kinh cánh tay bao gồm các nhánh thần kinh (gồm thần kinh giã, trụ, quay và cùi), tạo ra vô cảm cho chi trên từ giữa cánh tay trở xuống, bao gồm cả bàn tay.

Các phẫu thuật chi trên xa, như mổ cẳng tay và bàn tay, ngày càng được thực hiện trong môi trường ngoại trú do nguy cơ gây tê vùng. Gây mê toàn thân (GA) tuy hiệu quả nhưng có rủi ro như buồn nôn sau mổ và hồi phục kéo dài. Các kỹ thuật gây tê vùng (RA) mang lại ưu điểm như rút ngắn thời gian hồi phục, giảm sử dụng opioid và nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân. Trong số đó, ABPB được sử dụng phổ biến, đặc biệt cho các phẫu thuật bàn tay và cẳng tay, như tính đặc hiệu và độ an toàn cao. Nijs và cộng sự (2024) đã so sánh ABPB với các kỹ thuật gây tê vùng khác, bao gồm phong bì trên đòn (supraclavicular block) và dưới đòn (infraclavicular block).



## Phong bđ đđám rđ i thđ n kinh cánh tay đđ đđ ng nđách so vđ i các kđ thuđ t gây tê vùng khác

Viđ t bđ i Biên tđ p viên

Thđ hai, 02 Tháng 2 2026 10:06 - Lđ n cđ p nhđ t cuđ i Thđ hai, 02 Tháng 2 2026 10:31

---

[Xem tiđ p tiđ i đđy](#)