

BSCCKII. Tr_on Qu_oc Chi_on - Trung tâm Ung b_o u

PH_oN 2. Đi_o u tr_o ung th_o bi_o u mô t_o bào gan giai đ_on s_om [BCLC 0-A] và trung gian [BCLC B]

M_oT S_o CÁC KHUY_on NGH_o HI_on NAY

(1) Qu_on lý b_oi nhóm đa chuyên khoa (MDT – Multidisciplinary Team) đ_oc khuy_on ngh_o m_onh m_o cho b_onh nhân HCC giai đ_on s_om và trung gian [II, A].

(2) C_ot gan đ_oc khuy_on ngh_o cho b_onh nhân có m_ot kh_oi u đ_on đ_oc > 2 cm và không có b_ong ch_ong tăng áp l_oc t_onh m_och c_oa (BCLC 0 đ_on A) [II, A].

(3) C_ot gan đ_oc khuy_on ngh_o cho b_onh nhân có ch_oc năng gan Child-Pugh A, không có tăng áp l_oc t_onh m_och c_oa đáng k_o ho_oc các ch_ong ch_o đ_onh khác [III, A].

(4) C_ot gan có th_o đ_oc cân nh_oc _o nh_ong b_onh nhân đ_oc ch_on l_oc k_o, có ch_oc năng gan Child-Pugh B _on đ_onh và/ho_oc m_oc đ_o tăng áp l_oc t_onh m_och c_oa nh_o v_oi s_o cân nh_oc c_on th_on nguy c_o m_ot bù [III, B].

(5) C_ot gan đ_oc khuy_on ngh_o nh_o m_ot l_oa ch_on _o b_onh nhân HCC giai đ_on trung gian (BCLC B) không phù h_op v_oi các li_ou pháp trong đ_ong m_och [II, A].

(6) _o b_onh nhân x_o gan, ph_ong pháp c_ot gan xâm l_on t_oi thi_ou đ_oc khuy_on ngh_o [III, A].

(7) Đ_ot u b_ong vi s_ong (MWA – Microwave Ablation) ho_oc đ_ot u b_ong sóng cao t_on (RFA –

Ung thư biểu mô tế bào gan (tt)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 06 Tháng 5 2026 20:19 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 06 Tháng 5 2026 20:36

Radiofrequency Ablation) được khuyến nghị trong HCC giai đoạn rớt sớm (BCLC 0) [II, A].

(8) MWA hoặc RFA được khuyến nghị như một lựa chọn thay thế cho phẫu thuật cắt gan ở bệnh nhân HCC giai đoạn sớm (BCLC A) [II, A].

(9) Với lựa chọn giữa cắt gan hay đốt u cần xem xét các chỉ số kỹ thuật và phải được thảo luận bởi MDT [III, A].


(10) MWA hoặc RFA có thể được khuyến nghị cho các khối u đơn độc có đường kính 3–5 cm hoặc bệnh đa ổ (≤ 3 khối u, mỗi khối ≤ 3 cm) (BCLC A) nếu bệnh nhân không phải là ứng viên cho phẫu thuật cắt gan hoặc một phương án khác cho ghép gan toàn bộ đúng vị trí (OLT – Orthotopic Liver Transplantation) [II, B].

(11) Điều trị toàn thân bằng thuốc ức chế tyrosine kinase (TKIs – Tyrosine Kinase Inhibitors) hoặc các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (ICI – Immune Checkpoint Inhibitors) sau phẫu thuật cắt gan hoặc đốt u không được khuyến nghị [I, E].

Ung thư biểu mô tế bào gan (tt)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 06 Tháng 5 2026 20:19 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 06 Tháng 5 2026 20:36



[Xem tiếp tại đây](#)