

Thận trọng khi dùng thuốc giảm ho chứa codein

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 05 Tháng 7 2015 10:14 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 05 Tháng 7 2015 10:38

Ds Nguyễn Thị Mai

Codein là một methylmorphin, nhóm methyl thay thế của hydro nhóm hydroxyl liên kết với nhân thơm trong phân tử morphin, do vậy codein có tác dụng dược lý tương tự morphin, nhưng dược lực nhỏ hơn trong giảm đau và giảm ho, codein được hấp thu tốt qua đường uống và ít tác dụng phụ hơn morphin.

Codein thường được kết hợp với các thuốc khác như: paracetamol, thuốc aspirin hoặc diclofenac, được bán rộng rãi trên thị trường dưới dạng bào chế khác nhau như: dạng lỏng (siro), gói bột, viên nén, viên sủi để điều trị giảm đau và đau răng, giảm ho và cúm thông thường.



Vào tháng 10 năm 2015, Cơ quan y tế châu Âu (EMA) đã thông báo codeine không được sử dụng để điều trị ho và cúm thông thường ở trẻ em dưới 12 tuổi, và codeine không được khuyến cáo sử dụng ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi có nguy cơ nghiện và hội chứng ngưng thở khi ngủ và các vấn đề hô hấp mãn tính khác. FDA đang tiến hành điều tra sự an toàn của việc sử dụng các loại thuốc có chứa codeine để điều trị ho và cúm thông thường ở trẻ em dưới 18 tuổi vì nguy cơ tiềm ẩn do các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm chèn ép hô hấp khó thở. Trẻ em, đặc biệt là những người đã có vấn đề về hô hấp, có thể nhạy cảm hơn với các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Các bác sĩ, người chăm sóc nên nhận thấy bất kỳ dấu hiệu chèn ép và thở gấp, khó thở hoặc nôn ào, nhấc lồng ngực, hay buồn ngủ bất thường ở con mình nên ngừng sử dụng thuốc có chứa codeine và ngay lập tức đưa con em mình đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc và xử trí kịp thời. Các bác sĩ và người chăm sóc nên luôn luôn đặc biệt chú ý đến những

Thận trọng khi dùng thuốc giảm ho chứa codein

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 05 Tháng 7 2015 10:14 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 05 Tháng 7 2015 10:38

Thông tin cảnh báo được biết là các sản phẩm trong thành phần có chứa codeine.

Tài liệu tham khảo:

1. Dược thư Quốc gia 2012 Bộ Y Tế
2. Codeine Cough-and-Cold Medicines in Children: Drug Safety Communication - FDA Evaluating Potential Risk of Serious Side Effects- Drugs.com