

Bs Lê Thị Hà - Khoa Mắt

Thuốc có thể được sử dụng trong nhãn khoa bằng 2 cách: tại chỗ khi các thuốc được dùng trực tiếp vào mắt và dùng toàn thân khi thuốc được uống hay tiêm vào cơ thể rồi theo máu đến mắt. Điều trị thuốc toàn thân có hiệu quả hơn đối với các bệnh phần sau nhãn cầu: Bệnh hắc mống – màng bồ đào, củng mạc, võng mạc, thoái biến kinh và hắc mống.

I. Mục đích điều trị chung của điều trị thuốc tại mắt

Điều trị tại mắt có hiệu quả hơn đối với các bệnh thuốc phần trước nhãn cầu: kết mạc, giác mạc, tiền phòng và màng mắt. Tùy theo bệnh cảnh cụ thể có thể dùng thuốc tại mắt dưới dạng thuốc tra mắt nước, thuốc mỡ, thuốc tiêm dưới kết mạc, tiêm củng mạc, tiêm hạ cầu và thuốc đưa vào nhãn cầu bằng đường dẫn di hoặc bằng siêu âm di. Một số phương pháp đưa có ưu và nhược điểm riêng.

Hoạt chất trong hạ cầu các thuốc tra nhãn mục đích tiếp xúc với kết mạc và giác mạc trong thời gian ngắn (khoảng 30 phút). Tuy nhiên, thuốc có thể cũng tác động đến cơ thể bằng tính thấm của thuốc hoặc do sự dùng không đúng. Nếu mục đích duy trì hàm lượng thuốc cao tại mắt, thuốc cần được sử dụng thường xuyên, có nghĩa là hàng giờ hoặc nửa giờ 1 lần. Do đó, một vài loại thuốc tra mắt cũng có chứa thêm tá dược như methyl cellulose làm cho dung dịch thuốc nhầy hơn, khiến thuốc được tiếp xúc lâu hơn tại mắt.



1. 2014年11月，中国工商银行（以下简称“工商银行”）与渣打银行（以下简称“渣打银行”）在伦敦签署了战略合作协议，双方同意在跨境人民币业务、贸易融资、项目融资、资产管理、保险经纪、基金托管、基金销售、基金募集、基金投资、基金运营、基金估值、基金清算、基金会计、基金税务、基金法律、基金合规、基金风控、基金IT、基金其他等方面开展合作。