


DS. Võ Thị Thu

Tên chung quốc tế: Suxamethonium

Loại thuốc: Thuốc chẹn thần kinh – cơ khơng cởc

Dạng thuốc và hàm lượng: ịch tiêm Suxamethonium clorid : 20 mg; 50mg; 100mg/ml. Lich tiêm: 50mg; 100mg.



Dược lý và cơ chế tác động: Suxamethonium là thuốc chẹn thần kinh – cơ khơng cởc. Các thuốc chẹn thần kinh – cơ khơng cởc cởnh tranh với Acetylcholin ở thụ thể cholinergic tại bề mặt vớnnởng và cũng gởng nhở Acetylcholin, chúng gỏn vào các thụ thể đó gây nên khở cởc. Tuy nhiên, do ái lực cao với thụ thể cholinergic và tính kháng acetylcholinesterase, thuốc gây khở cởc kéo dài hơn acetylcholin. Tác động này lúc đởu gây ra co cơ thoáng qua, thỏng thỏy nhỏ gởt bó cơ, sau đó cơ chế đởn truyền thần kinh – cơ. Kỏu chẹn thần kinh – cơ này khỏng bở đỏi khỏng, thỏm chí có thỏ đỏc tăng cỏng bởi các thuốc khỏng cholinesterase. Dừng kéo dài hoặc nhỏ cỏi các thuốc chẹn thần kinh – cơ khỏ cởc có thỏ gây ra chẹn thần kinh – cơ gỏng nhỏ chẹn thần kinh – cơ khỏ khỏ cởc đởn đởn suy hô hỏp kéo dài hoặc ngỏng thỏ.

Suxamethonium đỏc dùng chỏ yỏu đỏ gây giãn cơ trong các thụ thụ tỏng nhỏ đỏt nỏi khỏ quỏn, nỏi soi, tiỏu phỏu, liỏu pháp gây sỏc bỏng đỏn hoặc bỏng thuốc sau khi đỏ gây mê toàn thân. Suxamethonium đỏc dùng chỏ yỏu đỏ gây giãn cơ trong thụ thụ tỏ chỏnh hình. Do thỏi gian tác động ngỏn, Suxamethonium thỏng là thuốc chẹn thần kinh - cơ khỏ cởc đỏc chỏn cho thụ thụ tỏ kéo dài đỏi 3 phút. Ngoài ra do thuốc bỏt đỏu tác động nhanh, nên thuốc thích

Cơ sở pháp lý thông tin mới về các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium

Vị trí biên tập viên

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 09:04 -

hợp cho tình trạng cơ thể khi cần đặt nội khí quản nhanh. Thời gian tác động của Suxamethonium có thể kéo dài bằng cách truyền tĩnh mạch liên tục hoặc chia thành liều nhỏ để tiêm.

Chỉ định: Hỗ trợ gây mê toàn thân, tạo thuận lợi cho đặt nội khí quản, giãn cơ trong phẫu thuật hoặc thông khí cơ học (thở máy), giúp mất cơ trong nạn nhân gãy.

Nhưng theo nguồn tin mới cơ sở pháp lý vào 25/12/2017 thì chế định của các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium được ghi nhận lại, cụ thể như sau:

- Cần nhắc việc sử dụng Suxamethonium trong chỉ định giãn cơ cho các phẫu thuật ngắn không còn thích hợp với các tiêu chuẩn hiện hành, mặt khác, do nguy cơ gây phản vệ khi sử dụng các cura giãn cơ nói chung và đặc biệt là Suxamethonium, các chế phẩm có chứa Suxamethonium không được sử dụng với chỉ định "gây mê tác động ngắn trong phẫu thuật".

- Các chế định của Suxamethonium từ nay được ghi nhận như một thuốc trợ mê cho gây mê toàn thân:

+ Người lớn và trẻ em: hỗ trợ đặt nội khí quản để nhanh chóng tiến hành thủ thuật được chỉ định mình bằng nguy cơ hít phải dịch dạ dày

+ Người lớn: trong điều trị bằng liều pháp số để có được sự giãn cơ nhanh chóng.

Thông tin dành cho các bác sĩ chuyên khoa cơ thể, gây mê hồi sức và đặc biệt là bệnh viện.

Người n: Chỉ định giấc được, Được cho quặng gia Vị t Nam

Bên quy định thu được Trung tâm Quặng gia và Thông tin thu được và Theo dõi phản ứng có hại của

Cập nhật thông tin mới về các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 09:04 -

thư c

Địa chỉ : 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội