

Các nội dung thay đổi/ bổ sung đối với thuốc chứa cefmetazol dùng tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 17 Tháng 7 2018 07:41 -

Ds Phạm Phú Trí - Khoa Dược

Công văn số 13398/QLD-ĐK ngày 13/7/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện, Viện có giám sát bệnh truyền nhiễm; Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam và việc cấp phát hàng hóa dùng để sản xuất thuốc chứa cefmetazol dùng tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch.

Các nội dung thay đổi/ bổ sung đối với thuốc chứa cefmetazol dùng tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch (Đính kèm theo công văn số 13398/QLD-ĐK ngày 13/7/2018 của Cục Quản lý Dược) có thể như sau:

[Đối với tất cả các thuốc chứa cefmetazol dùng tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch, thông tin trên nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng yêu cầu thay đổi nội dung các mục Chế độ nh, Liều dùng và cách dùng theo đúng các thông tin được cung cấp dưới đây]



1. Chế độ nh:

Cefmetazol dùng chứa để nh cho các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn còn nhạy cảm với thuốc như : Nhiễm khuẩn th phát c a viêm bàng quang, viêm thận, bể thận, viêm phúc mạc, viêm túi mật, viêm đường mật, viêm tuyến Bartholin và phần phụ, nhiễm khuẩn t cung, viêm kết mạc, viêm mô quanh xương hàm, viêm xương hàm.

2. Li u dùng và cách dùng:

2.1 Li u dùng:

- Đối với người lớn, tiêm tĩnh mạch hoặc truyền nh giọt tĩnh mạch li u 1 đến 2 g mỗi ngày, chia làm hai lần.

- Với trẻ nh , li u thông thường hàng ngày 25-100 mg/kg, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm truyền nh giọt tĩnh mạch, chia làm 2 đến 4 lần.

- Tuy nhiên, tùy thuốc vào tình trạng nhiễm khuẩn dai d ng hoặc nặng, tăng lên 4g cho người lớn, 150 mg/kg ở trẻ em mỗi ngày, chia làm 2 đến 4 lần.

2.2. Cách dùng:

- Hòa tan vào 10ml nước cất hoặc dung dịch Natri clorid 0,9% hoặc dung dịch glucose dùng truyền, tiêm tĩnh mạch ch m

- Ngoài ra, thuốc này cũng có thể dùng để truyền nh giọt tĩnh mạch. Mỗi 1 g khi cho truyền nh giọt tĩnh mạch nên dùng hòa tan t t trong dung dịch Natri clorid 0,9% khi s d ng. Truyền nh giọt tĩnh mạch b t bu c phải pha thuốc trong dung dịch dùng truyền ng./.

Nguồn: <http://www.dav.gov.vn/>