

Hội thảo chuyên gia Cộng đồng Giác Dị cảm & Ứng dụng lâm sàng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 10:40 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 11:24

Ngày 12 tháng 8 năm 2012 trung tâm ID & ADR Quốc gia phối hợp với Hội Tim Mạch TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên gia Cộng đồng Giác Dị cảm & Ứng dụng lâm sàng tại Đà Nẵng. Chủ trì hội thảo là GS-TS Đặng Văn Phước - Chủ tịch hội tim mạch TP.HCM. Tiếp đãi và trao đổi tại hội thảo còn có TS Nguyễn Hoàng Anh- PGD trung tâm ID & ADR Quốc gia cùng đồng đồng các bác sĩ, dị cảm sĩ đến từ các bệnh viện.



Trao đổi tại hội thảo Cộng đồng giác dị cảm và ứng dụng lâm sàng TS Nguyễn Hoàng Anh khuyến cáo các bác sĩ cần chú trọng đến thông tin cộng đồng giác dị cảm trước khi kê toa cho bệnh nhân.

Các nghiên cứu cho thấy có đến 19% bệnh nhân nằm viện gặp một tác dụng phụ có hại của thuốc, trong đó 70% phần trăm có hại của thuốc có thể phòng ngừa được. Các phần trăm có hại của thuốc xảy ra trong 6 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Tổng kê cho thấy ở Đức, chi phí y tế do tác hại của thuốc gây ra là 588 triệu đô la mỗi năm, và Anh con số này là

847 triệu đô la.

Theo TS Nguyễn Hoàng Anh với theo dõi an toàn thuốc giai đoạn hậu marketing là rất cần thiết nhằm đánh giá lợi ích/chi phí: mức độ nguy hại của bệnh nhân; phát hiện những tác dụng phụ hiếm gặp ($ADR < 1/1000$ của số bệnh nhân 18.200 bệnh nhân); để tính toán lợi ích/khi dùng dài hạn; đánh giá chi phí/lợi ích. “Công ty, Vastarel với hoạt chất Trimetazidine được lưu hành tại Pháp năm 1980 với chỉ định: điều trị đau phòng bệnh đau thắt ngực; điều trị hỗ trợ cho các trường hợp phù ứ tại, chóng mặt do vãn mạch; điều trị giảm thiểu các triệu chứng do nguyên nhân mạch máu. Qua quá trình nghiên cứu theo dõi an toàn thuốc giai đoạn hậu marketing, đánh giá lợi ích/nguy cơ của vastarel, quan quan lý dược phẩm Pháp (Afssaps) quyết định chỉ định được công bố báo cáo II: chỉ định cần thận trọng. Tại Việt Nam – Cục quản lý dược Việt Nam khuyến cáo: “Thuận trọng cần thận trọng lợi ích/nguy cơ khi sử dụng Trimetazidine được ứng dụng cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có tiền sử Parkinson”



Hội thảo chuyên gia Công nghệ Giác Dị cảm & Ứng dụng lâm sàng

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 10:40 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 11:24

GS. TS Đặng Văn Phấn, Chủ tịch hội Tim Mạch TP HCM cũng cho rằng, công nghệ giác dị cảm là vấn đề quan trọng mà bác sĩ cần lưu tâm. Các bác sĩ quan tâm và cần trang bị về vấn đề này sẽ giúp người bệnh tránh được nguy cơ phẫn ỉn đáng tiếc.

Ds Nguyễn Thị Mai- Khoa Dược