

Bệnh nhân tăng huyết áp (THA) sử dụng thuốc chống viêm phi steroid (NSAID) với liều dùng khác nhau. Các thuốc NSAID ức chế gắn mạch qua trung gian prostaglandin và làm tăng giãn mạch và nòng trong cơ thể. Cả hai cơ chế này đều góp phần làm các thuốc NSAID ức chế kháng một phần tác động của thuốc điều trị THA, đặc biệt với những thuốc có cơ chế tác động tác động thông qua prostaglandin, renin hoặc cân bằng natri và nòng trong cơ thể. Liều và khoảng thời gian dùng NSAID là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ức chế kháng tác động hạ huyết áp của những thuốc này. Dùng phối hợp NSAID ở liều cao và trong khoảng thời gian hơn 1 tuần thì có khả năng làm tăng huyết áp hơn.

Các thuốc NSAID ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị THA ở các mức độ khác nhau. Thuốc lợi tiểu, ức chế men chuyển, chẹn beta và ức chế thụ thể angiotensin II là các thuốc dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sự vô hiệu hóa tác động hạ huyết áp gây ra bởi NSAID. Các thuốc chẹn kênh calci và thuốc hạ áp theo cơ chế trung ương ít bị ảnh hưởng hơn.

Chú ý t  ng tác khi ph  i h  p thu  c ch  ng viêm phi steroid (NSAID) v  i thu  c đi  u tr   tăng huy  t áp

Vi  t b  i Bi  n t  p vi  n

Th   ba, 14 Th  ng 8 2012 20:18 - L  n c  p nh  t cu  i Th   ba, 14 Th  ng 8 2012 20:44

