

Lưu ý khi sử dụng thuốc Allopurinol

Vị t b i Biên t p viên

Th hai, 09 Tháng 9 2024 19:55 - L n c p nh t cu i Th hai, 09 Tháng 9 2024 20:00

Ds Lê Th Di u Hi n -

1. D c đ ng h c

Sau khi u ng, kho ng 80 - 90% li u u ng đ c h p thu nhanh qua đ ng tiêu hóa. N ng đ đ nh trong huy t t ng đ t đ c sau 2 – 6 gi li u th ng d ng. Kho ng 70 - 76% alopurinol đ c chuy n hóa ch y u gan thành oxipurinol. Alopurinol và oxipurinol không g n v i protein huy t t ng.

Sau khi u ng m t li u 300 mg, n ng đ cao nh t trong huy t t ng c a alopurinol kho ng 2 - 3 microgam/ml và c a oxipurinol kho ng 5 - 6,5 microgam/ml, có th tăng lên đ n 30 - 50 microgam/ml b nh nh n suy th n.

N a đ i trong huy t t ng c a alopurinol kho ng 1 - 3 gi , c a oxipurinol kho ng 12 - 30 gi , kéo dài rõ r t b nh nh n suy th n. C alopurinol và oxipurinol đ c liên h p thành đ ng ribonucleoside t ng ng c a chúng.

Lưu ý khi sử dụng thuốc Allopurinol

Vị t b i Biên t p viên

Th hai, 09 Tháng 9 2024 19:55 - L n c p nh t cu i Th hai, 09 Tháng 9 2024 20:00



[View full image](#) [Download image](#) [Print image](#) [Share image](#) [Copy image](#) [Zoom in](#) [Zoom out](#) [Reset](#) [Close](#)