

Ds Nguyễn Thị Mai

Codeine là loại thuốc giảm đau nhóm opioid, được sử dụng trong điều trị ho. Codein được bán rộng rãi nhất là loại thuốc được thành phần hoặc kết hợp với các chất khác như aspirin hoặc paracetamol.

Mechanism of action của codeine trên đau là do chuyển đổi thành morphin. Codein được chuyển thành morphine trong cơ thể bằng một loại enzyme gọi là CYP2D6. Trong một số trường hợp người bệnh có enzyme 'CYP2D6 metabolisers siêu nhanh' chuyển đổi codeine thành morphine một tốc độ nhanh hơn so với bình thường. Điều này dẫn đến nồng độ của morphine cao trong máu, có thể dẫn đến tác dụng độc hại như khó thở, suy hô hấp.

Theo báo cáo và đánh giá của các quan chức giám sát và Ủy ban quản lý rủi ro Châu Âu (PRAC) đã phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc tử vong sau khi uống codeine để giảm đau. Hầu hết các trường hợp xảy ra sau khi phẫu thuật cắt bỏ amidan vòm họng hoặc cho ngậm thuốc khi ngủ (bị gián đoạn thông khí xuyên cửa mũi trong khi ngủ).

Nên h_on ch_o s_o d_ong codeine đ_o gi_om đau ư_o tr_o em

Vi_ot b_oi Bi_oen t_op vi_on

Th_o hai, 17 Tháng 6 2013 18:10 -

