

Ds Nguyễn Thị Mai

Cetirizin là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, nhưng không gây buồn ngủ rõ rệt về mặt lý. Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc thụ thể H₁, nhưng hầu như không có tác dụng đối với các thụ thể khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối kháng acetylcholin và không có tác dụng đối kháng serotonin.



Cơ chế tác dụng của Cetirizin là ức chế cạnh tranh sự gắn kết của phức hợp dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm sự di động của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian

Cơ chế thông tin hàng ngày về sử dụng các thuốc cetirizin, loratadin, codein và aspirin

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 07:28 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 07:39

giai đoạn muộn của phản ứng dị ứng. Thuốc được hấp thu tốt qua đường uống sau 30 đến 60 phút với liều 10mg. Cetirizin thường được chỉ định trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mãn tính vô căn dị ứng dị ứng và trẻ em trên 12 tuổi và viêm mũi dị ứng theo mùa ở trẻ em trên 12 tuổi; viêm kết mạc dị ứng.

Những thông tin cần nhớ mọi người:

1. Không sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi
2. Không sử dụng quá 5 ngày cho 1 đợt điều trị.
3. Không sử dụng với các thuốc kháng histamine khác
4. Không sử dụng nếu bạn mang bầu, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.
5. Không sử dụng nếu bạn đang cho con bú, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.
6. Cần phải điều chỉnh liều nếu suy thận hoặc nặng và người đang tham phân thân nhân tạo.

Loratadin là một kháng histamin 3 vòng có tác dụng kéo dài đối kháng chọn lọc trên thụ thể H1 ngoại biên và không có tác dụng làm dịu trên thần kinh trung ương. Loratadin hấp thu nhanh sau khi uống có tác dụng làm nhẹ bớt triệu chứng của viêm mũi và viêm kết mạc dị ứng do giải phóng histamin. Loratadin còn có tác dụng chống ngứa và ngứa mề đay liên quan đến histamin.

Những thông tin cần nhớ mọi người:

1. Không sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
2. Trẻ vị thành niên khi sử dụng thuốc cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng như trên 6 tuổi.
3. Không sử dụng với các thuốc kháng histamine khác
4. Không sử dụng đồng thời với các thuốc điều trị triệu chứng cúm khác
5. Trẻ vị thành niên/bác sĩ/dược sĩ khuyên khi sử dụng đồng thời với các thuốc điều trị triệu chứng cúm khác.

Codein: là một methylmorphin có tác dụng giảm đau gây ngủ và giảm ho giống morphin.

Codein được hấp thu tốt bằng đường uống, liều điều trị codein ít gây ức chế hô hấp và ít gây nghiện hơn morphin. Khi sử dụng codein gây giảm nhu động ruột do vậy dùng rất tốt trong điều trị tiêu chảy do bệnh thần kinh ruột đại thần kinh, không được chỉ định cho tiêu chảy cấp và tiêu

Cập nhật thông tin hướng dẫn và sử dụng của cetirizin, loratadin, codein và aspirin

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 07:28 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 07:39

chảy do nhiễm khuẩn. Dùng giảm tác dụng táo bón nên kết hợp codein với các thuốc chống viêm, giảm đau không steroid.

Những thông tin cập nhật mới và sử dụng:

1. Không sử dụng quá 3 ngày.
2. Codeine là chất gây nghiện.
3. Không sử dụng nếu BN đang cho con bú, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.
4. Thuốc có thể gây ngã.

Nếu bị nh昏 ng, không lái xe hoặc vận hành máy móc.

Aspirin, hay acetylsalicylic acid (ASA): là một dẫn xuất của [acid salicylic](#), thuốc nhóm [thuốc chống viêm non-steroid](#)

; có tác dụng giảm

[đau](#)

, hạ

[sốt](#)

, chống

[viêm](#)

; ức chế kết tập tiểu cầu, khi dùng liều thấp kéo dài có thể phòng ngừa đau tim và hình thành cục nghẽn trong mạch máu.

Aspirin ức chế không thuận nghịch cyclooxygenase, do đó ức chế tổng hợp prostaglandin. Các tế bào có khả năng tổng hợp cyclooxygenase mới sẽ có khả năng tổng hợp prostaglandin sau khi ngừng dùng aspirin giảm. Tiểu cầu là tế bào không có nhân, không có khả năng tổng hợp cyclooxygenase mới, do đó cyclooxygenase bề mặt chế không thuận nghịch cho tới khi tiểu cầu mới được tạo thành. Ngoài ra, aspirin còn ức chế prostaglandin nội sinh, tuy nhiên ít ảnh hưởng với những người có sinh lý thận bình thường, nhưng có vai trò rất quan trọng trong duy trì lưu thông máu qua thận ở người suy thận mãn tính, suy tim, suy gan hoặc có rối loạn về thể tích huyết tương. Những người dùng thuốc này có thể dẫn đến suy thận cấp, giảm nội tạng và suy tim cấp tính khi sử dụng aspirin.

Do nguy cơ dị ứng chéo, nên không dùng aspirin cho người đã có triệu chứng hen, viêm mũi hoặc mày đay khi dùng aspirin hoặc những thuốc chống viêm không steroid khác trước đây.

Cấp nhật thông tin hàng ngày về sử dụng các cetirizin, loratadin, codein và aspirin

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 07:28 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 07:39

Người có tiền sử hen không được dùng aspirin do nguy cơ hen thông qua tăng tác cân bằng với prostaglandin và thromboxan. Không được dùng aspirin cho có bệnh về chảy máu, giảm tiểu cầu, loét dạ dày tá tràng, suy tim và và nặng, suy gan, suy thận để biết người có thể dùng liều cụ thể thận trọng 30ml/phút và bệnh xương.

Những thông tin cấp nhật mới về sử dụng:

1. Không sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi hoặc teenager thay đổi, cúm hoặc sốt khi có chỉ định của bác sĩ.
2. Chỉ sử dụng trong vài ngày trước khi có chỉ định của bác sĩ.
3. Sử dụng dài kỳ có thể gây hại.

Tài liệu tham khảo :

1. Dược thư Quốc Gia Việt Nam
2. Canhgiacduoc.org.vn