

Khoa Dược

Etoricoxib thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs), có tác dụng ức chế chọn lọc COX-2. Etoricoxib được sử dụng làm giảm triệu chứng trong các trường hợp thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm đốt sống dính khớp, triệu chứng đau và viêm trong các cơn gout cấp. Etoricoxib cũng được sử dụng để điều trị ngắn hạn các trường hợp đau mức độ trung bình sau khi phẫu thuật nha khoa.



Tại Việt Nam, etoricoxib đã được cấp phép lưu hành với những biệt dược khác nhau (Arcoxia, Agietoxib, Etoricoxib OPV, Fecotex, Magrax, Zostopain, Bambizol).

Tương tự các thuốc ức chế chọn lọc COX-2 khác nguy cơ tăng biến chứng tim mạch của etoricoxib tăng lên khi tăng liều và kéo dài thời gian sử dụng thuốc. Do vậy, chỉ sử dụng etoricoxib với liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Liều dùng trong điều trị được chia thành các nhóm sau:

- Thoái hóa khớp: 30mg, 1 lần/ngày, có thể tăng lên 60mg/ngày, trong trường hợp tăng đỡ mức liều 60mg/ngày mà không cải thiện hiệu quả điều trị thì cân nhắc thay thế bằng thuốc khác.

- Viêm khớp dạng thấp, viêm đốt sống dính khớp: 90mg, 1 lần/ngày.

- Cơn gout cấp: chỉ định giảm đau với liều khuyến cáo là 120mg, 1 lần/ngày, thời gian điều trị

Thận trọng khi sử dụng thuốc Etoricoxib

Vị trí biên tập viên

Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 09:39 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 09:54

túi đa là 8 ngày.

- Sau khi phẫu thuật nha khoa: chỉ dùng giảm đau với liều thường dùng là 90mg, 1 lần/ngày, thời gian dùng thuốc túi đa là 3 ngày.

Ngoài những chống chỉ định và các tác dụng không mong muốn của Etoricoxib, trong quá trình sử dụng etoricoxib để điều trị cho bệnh nhân cần lưu ý một số khuyến cáo sau:

• Nguy cơ tim mạch của etoricoxib có thể tăng lên khi tăng liều và kéo dài thời gian sử dụng thuốc, do đó chỉ sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Đáp ứng điều trị của bệnh nhân cần được định kỳ đánh giá lại.
• Trong quá trình điều trị, nếu gặp phản ứng bất lợi, cần cân nhắc ngừng sử dụng etoricoxib và thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp.
• Sử dụng thận trọng etoricoxib với các đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao mắc biến cố tim mạch (*tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá*).

Nguồn: Journal of pharmaceutical research and drug information