

Ds Nguyễn Thị Mai

Olmesartan là thuốc hàng đầu trong nhóm thuốc mẫn cảm tăng huyết áp, là chất ức chế đặc hiệu kháng chuyên biệt thụ thể angiotensin II (type AT1). Angiotensin II là chất có hiệu lực gây co mạch và là hormone có hoạt tính nguyên phát của hệ thống renin-angiotensin-aldosterone, đóng vai trò chính trong sinh lý bình thường của tăng huyết áp. Thuốc được sử dụng để điều trị các bệnh cao huyết áp khác. Ngày 03/7/2013, FDA đã có cảnh báo về sử dụng thuốc olmesartan medoxomil có thể gây ra các vấn đề đường ruột, còn được gọi là bệnh đường ruột giống bệnh sprue (sprue-like enteropathy). Các triệu chứng của bệnh đường ruột giống bệnh sprue bao gồm tiêu chảy mãn tính, nghiêm trọng có kèm sụt cân đáng kể. Các triệu chứng này có thể xuất hiện vài tháng hoặc vài năm sau khi bắt đầu sử dụng olmesartan và đôi khi cần phải nhập viện.



Ngày 27/03/2014, cơ quan quản lý dược phẩm và sức khỏe y tế Pháp (ANSM) cũng ban hành cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh ruột liên quan đến việc sử dụng olmesartan và khuyến cáo trong trường hợp bắt đầu dùng thuốc ức chế thụ thể angiotensin II, nên sử dụng thuốc khác cùng nhóm thay vì dùng olmesartan.

Trong ấn phẩm Medicines Safety Update, tập 5, số 2, tháng 4/2014, cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) cũng thông báo về việc: Thông tin sức khỏe của các thuốc chứa olmesartan medoxomil đã được cập nhật bổ sung thêm triệu chứng bệnh đường ruột giống bệnh sprue.

Tôi viết Nam hiện có 02 SĐK thuốc trong nước và 13 SĐK thuốc nước ngoài có chứa olmesartan medoxomil. Nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Các quản lý dược yêu cầu các công ty đăng ký, nhà sản xuất thuốc hiện việc bổ sung thông tin vào các tài liệu hướng dẫn và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc và các tác dụng không mong muốn của nhãn, tôi hiện đang nhận sử dụng thuốc như thông tin: “ Bệnh lý đường tiêu hóa mãn tính tương tự bệnh sprue: tiêu chảy mãn tính, nghiêm trọng kèm theo giảm cân ở các bệnh nhân sử dụng

Cơ sở pháp lý thông tin miễn phí của bệnh báo số dùng olmesartan medoxomil

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 24 Tháng 5 2015 20:15 -

olmesartan medoxomil xuất hiện vài tháng đến vài năm sau khi bắt đầu dùng thuốc. Kết quả sinh thiết ruột của các bệnh nhân thuyên giảm phát hiện có teo nhung mao ruột. Nếu xuất hiện những triệu chứng này trong quá trình điều trị bệnh olmesartan medoxomil, cần rà soát các nguyên nhân gây tiêu chảy khác và ngừng sử dụng thuốc olmesartan medoxomil sau khi đã loại trừ được các nguyên nhân khác”.