

Bs Nguy n Ng c Vĩ Khoa - Y h c Nhi t đ i


NEW YORK (Reuters Health) - M t nghiên c u so sánh k t qu v i tenofovir và entecavir cho b nh viêm gan B m n tính đã mang l i k t qu khác nhau, v i m t s phát hi n không còn có ý nghĩa th ng kê, các nhà nghiên c u t Hàn Qu c báo cáo.

Nghiên c u ban đ u (<https://bit.ly/2IG5Na8>), đ c công b vào tháng 9 năm 2018 trên JAMA Oncology và đ c b o hi m ngay sau đó b i Reuters Health, k t lu n r ng đ i u tr tenofovir c a viêm gan B m n tính có liên quan đ n kh năng s ng sót cao h n và t l ung th t bào gan th p h n (HCC), so v i đ i u tr entecavir.

Tr l i m t s th , Ti n sĩ Young-Suk Lim thu c Đ i h c Y khoa Ulsan, Seoul, đã ti n hành đánh giá toàn di n và k l ng đ li u c a h , trong đó h phát hi n ra các l i vô ý do tính toán sai th i gian theo dõi trong đoàn h toàn qu c c a h .

C th , s tr ng h p t vong ho c c y ghép đ c báo cáo trong nhóm đ i u tr entecavir đã gi m t 281 xu ng còn 269, trong khi con s trong nhóm đ i u tr tenofovir gi m t 228 xu ng 190.

K t qu là, t l nguy hi m cho t l t vong ho c c y ghép trong nhóm đ i u tr tenofovir đã tăng t 0,77 đáng k lên 0,89 không còn có ý nghĩa th ng kê, so v i entecavir.



<https://bit.ly/2Q0dUBW>, <https://bit.ly/2LC6KVX>, <https://bit.ly/2Ji5nd6>, <https://bit.ly/2Ji5nd6>