

Bs CKI Ph m Văn Sáu - Khoa C p C u

Vào lúc 22 gi ngày 27 tháng 6 năm 2016 Khoa C p c u BVĐK t nh Qu ng Nam ti p nh n m t b nh nhân Nguy n T n Ch. 51 tu i, quê Tam Anh Nam, Núi Thành, Qu ng Nam, vào vi n trong tình tr ng: b nh nhân l m , kích thích, nôn m a nhi u l n, nôn ra máu ít, tr y tu n hoàn, huyết áp t t: 70/40 mm/Hg, nh p tim ch m t n s 40 l n/phút. ECG: Block AV III. Các bác sĩ đã thăm khám, đánh giá tình tr ng b nh và đ c ng i nh à cung c p thông tin r ng tr c đó b nh nhân có u ng bia nhi u, c nghĩ say x n nên không đ ý, khi th y tình tr ng b nh nhân n ng, v t vấ kích thích đ ng th i tìm th y trái m p sát, kh n ng b nh nhân ăn v i ý đ nh t sát (vùng quê này ng i dân đ u bi t trái m p sát r t đ c khi ăn ph i) nên v i vấ đ a đi b nh vi n.



B nh nhân đ c làm t t c các xét nghi m huyết h c, sinh hóa máu và siêu âm; không th y tình tr ng thi u máu, ch a th y bi u hi n suy gan – th n và r i lo n đi n gi i.

Đ c ch n đoán: Ng đ c trái m p sát, kh n ng có ý đ nh t sát/ Bi n ch ng: Tr y tu n hoàn – Block AV III, hôn mê.

B nh nhân đ c x trí h i s c v i th oxy, bù d ch, tiêm Atropin và chuy n khoa H i s c tích c c- ch ng đ c (ICU) đi u tr ti p. Tiên l ng b nh r t n ng vì đ n mu n h n 6 gi , tình tr ng nghi m đ c n ng.

Theo d c sĩ Lê Quân Trung bài vi t “Nh ng lo i cây ch a đ c t th ng g p”- NXB Quân đ i nhân dân, cây m p sát còn có tên khác: H i qua t - Tên khoa h c: *Cerbera manghas* L (C. odollam Gaertn) – Thu c h trúc đào: Apocynaceae, cây g nh , m m, cao t 4-6m thân có v

Nhân mọt trắng ngả ngả đặc trái mọt p sát ở BVĐK tỉnh Quảng Nam

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 03, 03 Tháng 8 2016 10:23 - Lần cập nhật cuối Thứ 03, 03 Tháng 8 2016 10:34

dày, xù xì, lá có phiến thon, bóng; gân phình mảnh, nhôu cuống dài, mọc so le, cuống hoa mọc ở đầu cành thành xim, hoa màu trắng, thơm; quả hình ch, hình trứng hay hình cầu, khi chín màu vàng trắng, chẻ hai hạt; ra hoa từ tháng 3 đến tháng 5, ra quả từ tháng 6 đến tháng 8.

Mọt p sát phân bố ở vùng ven biển, các nước nhiệt đới châu Á, từ Malaysia đến Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam cây phân bố ở các bãi biển từ Nam đến Bắc, song cây tập trung nhất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trở vào. Ở Quảng Nam cây phân bố ở các xã ven sông biển thuộc các huyện Thăng Bình, Núi Thành

Đặc tính: Cây mọt p sát được xếp vào nhóm cây độc, vì trong hạt có chứa các chất Cerberin, Cerbevosid, nesifolin, Theretin rất độc đối với tim, có khả năng gây tử vong, loài trái độc này có thể gây chết người từ 3 – 6 giờ sau khi ăn phải, nếu ăn vào cây có tác dụng gây mê, ăn phải hạt mọt p sát có biểu hiện ngộ độc tức thì như ngộ độc lá trúc đào, có triệu chứng xuất hiện sau khi ăn 10 – 15 phút, gồm: Buồn nôn, đau bụng, nôn ói dữ dội, tiêu chảy sau đó mất lã. Các triệu chứng thần kinh gồm: mất ngủ, lơ mơ Họ tìm mồi bằng cách bay như ong nh, gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, nhịp tim chậm l, không đều, gây tử vong nhanh nếu không xử lý kịp thời bằng thuốc chống loạn nhịp tim như atropin, thuốc vận mạch và đặt máy thở nhân tạo kịp thời.

Qua nghiên cứu ban đầu trên, chúng ta cần tuyên truyền để không để xảy ra tử vong trái mọt p sát, nhất là trẻ em ở vùng ven sông có nhiều cây mọt p sát mọc, cần tuyên truyền để các cháu không được ăn trái cây này.