

Bs. CKI: Ngô Thị Thu Thảo -

Răng gãy vỡ ở vùng thẩm mỹ là một chấn thương khá phổ biến, thường do các tai nạn trong sinh hoạt hoặc giao thông gây ra. Tình trạng này thường xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó, trẻ thường là chấn thương phổ biến nhất ở răng sữa, còn gãy thân răng lòi thường gặp hơn ở răng vĩnh viễn. Việc chấn đoán chính xác, lập kế hoạch điều trị hợp lý và theo dõi kỹ lưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đạt được kết quả điều trị tốt nhất.

Việc sơ cứu ngay lập tức mô nh răng vỡ để phục hồi giúp tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị cho bệnh nhân, đem lại kết quả tự nhiên nhất so với các phương pháp điều trị khác.



[Xem tiếp đây](#)

Case lâm sàng phác họa gãy vỡ lòn do chấn thương bong phồng pháp dán và tái tạo mô nh răng t

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 03 Tháng 10 2024 16:55 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 04 Tháng 10 2024 08:16
