

CN Đoàn Thị Tuyết - Khoa Nội tiêu hóa

Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng là phương pháp thăm khám trực tiếp phần trên của ống tiêu hóa, nhằm quan sát và phát hiện những bất thường bên trong ống tiêu hóa. Từ đó, giúp cho việc điều trị cho bệnh nhân được hiệu quả hơn. Một số bệnh nhân thường có cảm giác lo sợ trước và trong khi nội soi vì vậy việc chuẩn bị bệnh nhân trước khi nội soi rất quan trọng giúp bệnh nhân yên tâm và hợp tác tốt trong quá trình nội soi nhằm tránh những tai biến có thể xảy ra cho bệnh nhân và nhân viên y tế.



I. HÀNH CHÍNH:

Chuẩn bị trước khi làm thủ thuật soi thực quản- dạ dày- tá tràng

Vị trí biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 15:05 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 17:29

- Họ và tên:.....tuổi
- Địa chỉ
- Bảo hiểm y tế /Viện phí
- Kiểm tra các kết quả xét nghiệm cũ trước khi soi nếu có
- Hệ thống máy tính có đủ liệu bệnh nhân chưa
- Ký giấy cam kết (nếu bệnh viện qui định)

II. PHÒNG SOI:

- Hệ thống máy soi
- Hệ thống bồn rửa dụng cụ
- Hệ thống cấp thoát nước sạch và ưu tiên
- Hệ thống điện ưu tiên
- Bàn khám nội soi
- Tủ thuốc - Hộp thuốc chống sốc phản vệ
- Tủ đựng dụng cụ nội soi
- Tủ đựng hồ sơ
- Bàn ghế :Bác sĩ , điều dưỡng, bệnh nhân trước và sau soi
- Bảng ca đặt phòng cấp cứu khi cần
- Hệ thống máy tính và máy in
- Hệ thống oxy
- Đèn cấp cứu
- Tủ lạnh (nếu có)
- Quạt hút
- Nhà vệ sinh
- Thùng rác đựng利器
- Lọ sinh thiết + tăm que
- Kẹp sinh thiết
- Ngáng miệng
- Bồn hút đờu
- Khăn lau miệng bệnh nhân và máy
- Bơm tiêm 50ml và nước cất
- Gel bôi trơn (KY)

III. BỆNH NHÂN:

- Bệnh nhân nhịn ăn uống trước khi soi 6-8h

Chuẩn bị trước khi làm thủ thuật nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng

Vị trí bệnh Biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 15:05 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 17:29

- Bệnh nhân đang uống thuốc cần thông báo cho bác sĩ về loại thuốc đang uống.
- Giới thiệu bệnh nhân trước khi xét thuốc tê và cảm giác trong quá trình bác sĩ đưa ống soi vào họng để bệnh nhân biết và làm theo hướng dẫn của bác sĩ và điều dưỡng trong khi soi.
- Xét tê cho bệnh nhân Xilocain Spray 10%
- Lập đường truyền nội u cần (bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa.....)
- Chụp XQuang (gập xẹp)
- Cho bệnh nhân nằm trên bàn khám nội soi thì bệnh nhân nghiêng sang trái, chân trái duỗi thẳng, chân phải co, có răng giả tháo ra, đặt ngáng lên vào miệng bệnh nhân.

Chuẩn bị các bước cần thận và đầy đủ sẽ giúp cho thủ thuật tiến hành thuận lợi, an toàn, bệnh nhân yên tâm và hợp tác với thầy thuốc.