

Bs Hs Kien Phát - Khoa Ngoại TN-LN

I. Định nghĩa:

Giãn tĩnh mạch tinh là hiện tượng giãn bất thường của tĩnh mạch tinh và đám rối tĩnh mạch tinh. 90% giãn tĩnh mạch tinh xảy ra ở một bên và thường là bên trái. Lý do chủ yếu để nghi ngờ ở bệnh đi khám là đau tức vùng bẹn búi hoặc hiếm muộn con cái.

II. Nguyên nhân:

Cơ chế gây giãn tĩnh mạch tinh là do không có van hoặc thiếu năng lực thông van, vì vậy có trào ngược của máu từ tĩnh mạch thò vào đám rối tĩnh mạch tinh làm tĩnh mạch dần dần giãn rộng.

III. Lâm sàng:


1. Triệu chứng:

- Có cảm giác khó chịu, căng tức, đau tinh hoàn. Đôi khi, nghi ngờ ở bệnh có cảm giác nóng ở búi hoặc một tình trạng khó chịu mà không búi.
- Bệnh nhân thường nhìn thấy hay sờ thấy búi tĩnh mạch giãn to ngoằn ngoèo như búi giun nằm trong búi khi đứng.
- Bệnh nhân thường sờ thấy tinh hoàn một bên nhỏ hơn bên đối diện và lo lắng đi khám bệnh.
- Vô sinh.

Bệnh giãn tĩnh mịch tinh

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 09 Tháng 10 2016 21:54 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 05:35



Chẩn đoán và điều trị bệnh giãn tĩnh mạch tinh (bệnh giãn tĩnh mạch tinh) là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa bác sĩ chuyên khoa và bệnh nhân. Việc chẩn đoán bệnh giãn tĩnh mạch tinh thường dựa trên các triệu chứng lâm sàng và kết quả siêu âm Doppler màu. Điều trị bệnh giãn tĩnh mạch tinh có thể được thực hiện bằng phẫu thuật hoặc các phương pháp không phẫu thuật. Việc điều trị bệnh giãn tĩnh mạch tinh cần được thực hiện sớm để tránh các biến chứng như vô sinh, đau đớn và suy giảm chức năng sinh sản.