

## **KTV Ninh Thập Trạng Công Nhân - Khoa PHCN**

### **I. ĐỐI CƯỢNG:**

Gân là một bộ phận nhỏ y cộm với tìn thủng, tìn thủng thì dễ nhúng hời phác thì khó. Lợi do gân ít có mạch máu nuôi dưỡng nên cũng rất dễ bị hoại tử. Không giống như cơ, gân hoạt động như sợi dây trện cơ hoạt động như y trong bao gân. Nếu chúng may bao gân bị viêm thì gân sẽ bị viêm dính ngay và khó cử động. Vì thế nhúng vùng có gân như u nhò bàn tay, bàn chân, nhúng di chuyển dễ thấy là bàn tay sẽ co quắp lại và chân bị vẹo cẳng. Trong các vết thủng chi thì vết thủng đứt gân, đứt bì đứt đứt gân bàn tay là một trong nhúng tìn thủng thủng gập nhọt. Vết thủng bàn tay nói chung và tìn thủng gân nói riêng hời nhò không nhò nhúng tìn tính nhúng nhúng i bệnh, nhúng nhúng u xử trí không tốt có thể dễ di chuyển nhúng nhúng, gây tàn phế, một khố năng lao động và nhúng thủng nhúng u đứt sinh hoạt hàng ngày, cũng nhò tâm lý cở a nhúng i bệnh.



Ngày nay, trên thế giới cũng nhò Việ Nam, với các thành tựu về giời phẫu, kỹ thuật khâu nối và phẫu pháp phác đồ i chích năng nên kỹ thuật nối gân ngày càng được hoàn thiện.

### **II. CÁC YẾU TỐ NH HƯNG ĐẾN SỰ DÍNH GÂN SAU NỔ:**

Có 3 yếu tố nh húng trứ c tiếp đến sự dính gân sau mổ :

Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 06:39 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 06:58

- Yếu tố cơ học: Sau mổ quá trình xơ viêm sẽ hình thành nên u không đáng kể và nên được ngấm. Vì vậy, việc nên được ngấm sau phẫu thuật rất quan trọng. Việc nên được ngấm sẽ hạn chế và phá vỡ đường liên kết của các sợi xơ non hình thành.
- Yếu tố hóa học: Việc sử dụng các chất chống viêm sau phẫu thuật giúp hạn chế quá trình hình thành các sợi xơ do viêm nhiễm sau mổ
- Yếu tố vật lý: Vai trò của sóng ngắn cũng làm hạn chế sự dính gân ở bên ngoài.

## 2 / 3

## **Phức hợp chức năng cho bệnh nhân sau mổ đột gân bàn tay**

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 06:39 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 06:58

---

Tài liệu tham khảo:

1. Sách chuyên khảo dùng cho cán bộ ngành PHCN – nhà xuất bản Y Học Hà Nội