

Bs Nguyễn Hoàng Kim Ngân - Khoa ICU

Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy rằng bệnh nhân bị chấn thương sọ não (CTSN) cấp tính, huyết áp tâm thu (HATT) trung bình lúc vào viện càng cao thì càng tốt – đó là một phát hiện thách thức sự hiểu biết hiện nay về một ngưỡng gì đó mà có ý nghĩa lâm sàng.

Đây là nghiên cứu lớn nhất cho tới nay xem xét về vấn đề này, đã cho thấy mối liên hệ tuyến tính giữa HATT trung bình lúc vào viện thấp nhất với xác suất tử vong được điều chỉnh nghiêm ngặt trên toàn bộ phạm vi huyết áp từ 40 đến 120 mmHg.

Các nhà nghiên cứu lưu ý phát hiện này được công bố trực tuyến vào ngày 7/12 trên tạp chí JAMA Surgery, cho thấy rằng não bệnh nhân chấn thương, với một sinh lý hệ huyết áp có thể có thể xảy ra ở mức huyết áp cao hơn đáng kể so với các bệnh nhân hiện nay.

Chẩn đoán imaging sọ não và huyết áp – một số chuyển đổi mô hình

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 29 Tháng 3 2017 10:30 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 30 Tháng 3 2017 16:27

