


Bs Huỳnh Ngọc Tin - Khoa Nội thận - nội tiết

Suy thượng thận cấp (STTC) là một cấp cứu nội khoa do thiếu hụt corticoid cấp tính, ít khi đi kèm với thiếu hụt corticoid khoáng. Chẩn đoán bệnh thượng thận khó khăn do triệu chứng lâm sàng và sinh hóa không đặc hiệu. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong, bệnh thượng thận dễ bỏ sót với chẩn đoán lâm sàng tìm mạch không rõ nguyên nhân. Do vậy cần được điều trị kịp thời, tức thì ngay khi chẩn đoán xác định, mới có thể có vài triệu chứng nghi ngờ.

Suy thượng thận cấp thường gặp trong bệnh cảnh phát cơn Addison không được chẩn đoán hoặc điều trị không đầy đủ. Bệnh cũng có thể gặp sau một đợt điều trị corticoid kéo dài.



Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị suy thận cấp

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 15 Tháng 9 2019 08:35 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 15 Tháng 9 2019 08:41

[Xem tiếp tại đây](#)