

Xuân Hiên -

(QNO) - Lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam dùng đặt nội sọ để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp.

Cố thủ, bệnh nhân nam 75 tuổi (quê Thăng Bình) nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, nói ngọng. Được biết, trong lúc đang được bác sĩ thăm khám, bệnh nhân đột ngột hôn mê, liệt tứ chi, rơi lơ lửng nhợt nhạt.

Các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng đột quỵ thiếu máu não cấp, tiên lượng rất nặng. Để kịp can thiệp đặt nội sọ để cứu sống ngay lập tức. Bệnh nhân được nhanh chóng đưa đi chụp CT môch máu não, kết quả cho thấy có ổ máu tụ trong ổ não phải.

Bác sĩ Trần Lâm - Trưởng khoa Nội - Tim mạch BVĐK Quảng Nam cho biết, êkip phẫu thuật phải can thiệp để lấy huyết khối bị ngưng đọng, nhưng tiền thuyên tắc của bệnh nhân không được như đoán ban đầu. Theo các bác sĩ, chèn tắc bộ lọc rất nặng do máu vón vĩa chèn không phải do đặt nội sọ do huyết khối (đã sử dụng các ca khác chèn lọc hút huyết khối tái thông là thành công). Bệnh nhân được tiếp tục nong bóng chèn lọc, tuy nhiên vẫn không thành công.



"Sau khi hội ý chuyên môn khẩn cấp, bệnh nhân đã được đặt 1 stent vào ổ máu tụ để ngăn máu chảy vào ổ não. Sau đặt stent thành công, ổ máu tụ không còn chèn và dòng chảy máu não trở lại bình thường. Bệnh nhân tỉnh lại ngay trên bàn mổ" - bác sĩ Trần Lâm cho biết.

Đặt stent nội sọ để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ 7, 21 Tháng 7 2021 17:10 - Lần cập nhật cuối: Thứ 7, 25 Tháng 7 2021 09:32

Các bác sĩ can thiệp đột quỵ não cho biết, đây là trường hợp đầu tiên tại BVĐK Quảng Nam phải dùng đến kỹ thuật đặt stent nội sọ để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp. Trước đó 2 tuần, cũng có bệnh nhân đột quỵ cấp do tắc gây cục máu cục trong trái não ngay chỗ chỗ hút huyết khối và nông bóng đã hỏi phác lỵ sọ lỵ u thông mạch máu cho bệnh nhân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các bác sĩ của BVĐK Quảng Nam đã can thiệp thành công 2 ca đột quỵ não và phác tỵ p vỹ i vỹ c kị t hị p hút huyết khối kèm nông bóng và đặt stent cấp cứu.

Điều này mở thêm nhiều cơ hội cho bệnh nhân đột quỵ, đặc biệt là những ca nặng vào viện sớm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân đột quỵ tại BVĐK Quảng Nam.

Tắc cục máu cục thân não là một dạng cục a đột quỵ não. Mặc dù tỷ lệ mắc ít hơn so với các dạng khác, nhưng mức độ nguy hiểm rất cao. Nếu hệ thống kinh trung ương bị tổn thương thì gây nên bệnh nhân sẽ mất hết chức năng sống và dẫn đến tử vong nhanh.

Bác sĩ Trần Lâm khuyến cáo, khi phát hiện có những biểu hiện bất thường như: bên ng dị ng mị t mị i, méo miệng, nói khó, nói đ, tay chân không cị dị ng đị c, đau đ, u, thị lị c giị m, hôn mê, khó th, ... ngay lập tị c đị a bị nh nhĩn đĩn bị nh vỹn đĩ đị c xị trí cị p cị u cĩng sị m cĩng tị t. Vỹ i bị nh nhĩn bị đĩ t quĩ, thĩ i gian chính là não. Mị t thĩ i gian đĩ ng nghĩĩ vỹ i mị t não, đĩn đĩn tị vong hoĩ c cĩc di chĩ ng không mong mĩn.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/y-te/dat-stent-noi-so-de-cap-cuu-benh-nhan-dot-quy-cap-114772.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR1fyI6kJYE9kBYrHUZgbkuvD348ObJ88-hesxt5acRuhsVdRG5B3KDsv60