

Chăm sóc phác họa chức năng cho người bị bệnh sau tai biến mạch máu não

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 19 Tháng 9 2012 14:27 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 19 Tháng 9 2012 15:18

Tai biến mạch máu não (TBMMN) là giảm chức năng của não xảy ra đột ngột do mạch máu não bị vỡ hoặc tắc mà không phải do chấn thương.

TBMMN tăng theo lứa tuổi nhất là 50 tuổi trở lên, nam thường gặp hơn nữ. Bệnh rất nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh, tàn tật vĩnh viễn. Tỷ lệ tử vong hàng tháng hai sau ung thư ở Mỹ và Châu Âu, hàng tháng ba sau ung thư và bệnh lý tim mạch là nguyên nhân công nghiệp phát triển. Hơn 60% di chứng nặng nề, đặc biệt là di chứng vận động dẫn đến tàn tật nghiêm trọng, gây gánh nặng về kinh tế, tinh thần của gia đình và xã hội. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200 000 người bị TBMMN (GS-TS Lê Văn Thành chủ tịch hội phòng chống TBMMN đưa ra từ hội thảo đột quỵ não được tổ chức tại TP HCM vào ngày 04/10/2011).

Điều trị kịp thời, đúng theo bệnh và công tác chăm sóc phác họa chức năng theo đúng phác đồ giúp bệnh nhân phục hồi tốt nhất, hạn chế tối đa di chứng và biến chứng.

Chăm sóc phức hợp chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 19 Tháng 9 2012 14:27 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 19 Tháng 9 2012 15:18



Chăm sóc phức hợp chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não và



Hình 1

Hình 2

Hình 3

Chăm sóc phức hợp chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não và

Chăm sóc phức hợp cho người bệnh sau tai biến mạch máu não

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 19 Tháng 9 2012 14:27 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 19 Tháng 9 2012 15:18



Hình 4



Hình 5




Hình 6



Hình 7



Hình 8



Hình 9