

Bs. Trần Thị Minh Thanh -


I. Định nghĩa

Nội soi tiêu hóa là một công cụ quan trọng để chẩn đoán và điều trị các bệnh về đường tiêu hóa. Tuy nhiên, khi nội soi được thực hiện trong thời kỳ mang thai, thủ thuật có những lo ngại về sự an toàn của nó đối với mẹ và thai nhi.

Trong hầu hết các trường hợp tiêu hóa, nội soi tiêu hóa có vai trò chẩn đoán và điều trị chính, nhưng nó không được biết đến nhiều khi thực hiện ở bệnh nhân mang thai, do khả năng gây hại cho thai nhi như thiếu oxy, sinh quái thai, chèn ép, nhau bong non hoặc khi phát chuyển biến xấu.

Nội soi thủ thuật được coi là một thủ thuật có rủi ro thấp, thủ thuật được thực hiện theo yêu cầu của bệnh nhân trong bệnh viện. Tuy nhiên, tính an toàn và hiệu quả của nội soi tiêu hóa trong những trường hợp cấp cứu bị tắc nghẽn mang thai vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong thời kỳ mang thai, các rủi ro đối với thai nhi và bà mẹ rất đa dạng và mức độ của rủi ro này cũng khác nhau tùy theo tam cá nguyệt. Cần nhận thức được những khó khăn trong việc thực hiện các nghiên cứu đó đối với phụ nữ mang thai, nhưng rủi ro này vẫn chưa được đánh giá đầy đủ.

Nội soi dạ dày tá tràng chủ yếu được thực hiện trong thời kỳ mang thai khi không có cách nào khác để chẩn đoán hoặc điều trị ít xâm lấn hơn, các chỉ định cho thủ thuật là rõ ràng và nội soi dạ dày nên được hoãn lại càng nhiều càng tốt cho đến tam cá nguyệt thứ ba.



Được biên tập và kiểm tra bởi các chuyên gia y tế. Nội dung này không phải là lời khuyên y tế và không nên thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm y tế nào.