

Bs. Trần Thị Minh Thảo -

Đội công

Ung thư đại trực tràng là bệnh ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới, cho cả 2 giới và là nguyên nhân thứ hai gây tử vong liên quan đến ung thư ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Tháng kể năm 2020, ung thư đại trực tràng là bệnh ung thư đứng hàng thứ 5 ở Việt Nam.

Ung thư đại trực tràng cũng là một trong những ung thư có thể ngăn ngừa được vì nó phát sinh từ các u lành tính, 90% ung thư đại trực tràng xuất phát từ polyp tuyến tính giai đoạn trung bình đến polyp dạng u tuyến chuyển thành ung thư 10-20 năm. Nội soi đại trực tràng phát hiện và điều trị polyp là một sự cần thiết, mà 1% phát hiện polyp tuyến tính đại trực tràng làm giảm 3% nguy cơ tử vong trở thành ung thư, cắt polyp tuyến tính đại trực tràng làm giảm 76-90% ung thư đại trực tràng.

Nội soi đại tràng đã được coi là tiêu chuẩn vàng trong sàng lọc ung thư đại trực tràng (CRC). Trong những năm gần đây, các kỹ thuật hình ảnh nội soi khác nhau đã được giới thiệu để cải thiện chất lượng nội soi. Tỷ lệ phát hiện u tuyến (ADR) là chỉ số chất lượng quan trọng nhất cho nội soi.

[Xem tiếp tại đây](#)