

BS LÊ CHÁNH TÚ -

CMV là gì?

CMV là một virus DNA sợi kép thuộc họ herpes, lây truyền qua tiếp xúc tình dục hoặc tiếp xúc trực tiếp với máu, nước tiểu hoặc nước bọt nhiễm virus. Sau thời gian ủ bệnh 28–60 ngày (trung bình 40 ngày), cơ thể tạo kháng thể IgM, sau đó là IgG. Virus có thể tồn tại tiềm ẩn trong cơ thể và có thể tái hoạt động hoặc tái nhiễm.

Ai có nguy cơ nhiễm CMV cao hơn?

CMV có thể nhiễm mọi lứa tuổi. Những người tiếp xúc thường xuyên với trẻ nhỏ (như nhân viên giữ trẻ hoặc gia đình có trẻ nhỏ) có nguy cơ cao hơn. Tỷ lệ nhiễm tăng theo số lần sinh.

CMV bẩm sinh phổ biến như thế nào?

CMV là nhiễm trùng bẩm sinh phổ biến nhất, gặp 0,2–2,2% trẻ sơ sinh. Đa số trẻ không có triệu chứng lúc sinh nhưng có thể diễn biến lâu dài.

Tỷ lệ nhiễm CMV ở thai phụ?

Nhiễm tiên phát xảy ra ở 0,3–4% thai phụ chưa có miễn dịch. Những người đã có miễn dịch vẫn có thể bị nhiễm thể phát do tái hoạt động hoặc nhiễm chủng khác.

[Xem tiếp đây](#)

Cytomegalovirus (CMV) trong thai kỳ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 15 Tháng 9 2026 14:12 -
